



## **Registrering av operationsindikation vid primärinsättning av bröstprotes**

Vid genomgång av data i BRIMP har vi konstaterat att 25 % ofullständiga registreringar avser indikation till indexoperation. För att förbättra BRIMP's kvalitet vill vi därför förtydliga hur våra olika indikationer definieras.

### **A) Patientupplevd hypoplasia**

Här registreras alla patienter som bedöms av operatören som en estetisk indikation.

### **B) Primär mikromasti**

Omfattar patienter med avsaknad av submammar veck, atrofi eller aplasi av bröstvävnad och tillstånd av mycket små bröst i förhållande till kroppens längd och vikt. Dessa patienter har inte varit gravida.

### **C) Sekundär mikromasti**

Omfattar rekonstruktioner av bröst vid TS, tillstånd efter stor viktnedgång, tillstånd efter graviditet och amning, tillstånd efter sequelae vid bröstkirurgi (ex för små bröst efter reduktion eller komplikation efter godartad bröstkirurgi).

### **D) Tuberösa bröst**

Godartad bröstmissbildning enligt ICD.

A-D kan kombineras med Asymmetri.

### **E) Profylaktisk mastektomi**

Rekonstruktion av bröst vid genetiskt betingad ökad risk för bröstcancer.

### **F) Rekonstruktion efter mastektomi**

Omfattar primär rekonstruktion med permanent protes eller expanderprotes samt sekundära rekonstruktioner. Inga expanderar registreras som planeras för byte mot permanent protes.

16 04 14

Birgit Stark  
Registerhållare BRIMP